Prova ~~no~~ estratta Giuseppe Bastin

ATS BRIANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Assistente Sanitario - Cat D

PROVA PRATICA

PROVA 01

BRANO BB 23

Leggere il seguente case study e rispondere ai relativi quesiti.
Il ruolo dell'inchiesta epidemiologica sarà strategico ai fini dell'individuazione tempestiva della catena di trasmissione e del contenimento dell'infezione.
Obiettivo: individuare tempestivamente i contatti stretti e la fonte di contagio, con particolare riferimento al contesto famigliare, lavorativo e comunitario.

Fabio anni 38, lavora come portinaio in uno stabile in centro città.
Abita a Seregno provincia MB.
Vive con la moglie Federica, di anni 30, professione commessa in un panificio in centro città, molto frequentato.
La suocera Teresa, vedova, di anni 62, mentre i genitori sono al lavoro, cura i due nipoti, figli della coppia, Bianca di anni 2 e Michele di anni 5.
Fabio durante la sua attività, in data 5 giugno, consegna la posta alla sig.ra Elena di anni 85, con la quale sosta sul pianerottolo circa 20 muniti per parlare con lei.
In seguito ad una perdita d'acqua in data 6 giugno, entra in casa del sig. Tito, di anni 66 e ispezione con lui l'appartamento, si trattiene non oltre 10 minuti.
Nei giorni precedenti i sintomi incrocia all'ingresso dello stabile circa 8 inquilini, con i quali non si trattiene oltre il formale saluto.
Al termine della giornata lavorativa, si reca al vicino panificio per tornare a casa con la moglie.
Si sofferma a chiacchierare con i gestori del panificio Sandra e Daniele rispettivamente di anni 57 e 59.
In data 1 giugno la sig.ra Elide, inquilina del primo piano, di anni 88, chiama Fabio per un malore.
Fabio entra in casa e visto che Elide non si riprende chiama subito i soccorsi. Elide viene ricoverata con sintomatologia sospetta per Covid19.
In data 10 giugno Fabio in seguito a febbre elevata sopra i 38 °C e mal di testa, dolori articolari, stanchezza, congiuntivite, mal di gola si rivolge al MMG.
IL MEDICO pone Fabio in isolamento domiciliare e instaura le cure del caso.
Fabio al termine della sintomatologia si sottopone a Tampone in data 22 giugno, con esito positivo.

---

1 **D00001**

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BB 23

Il candidato, effettuando l'inchiesta epidemiologica per identificare i contatti stretti, scelga il set corretto fra i tre sottoscritti.

* A) CONTATTI STRETTI una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa medica) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.
Sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso
Nella ricostruzione dell'arco temporale in cui individuare i contatti è quindi importante considerare due variabili: 1) La data inizio sintomi; 2) La data in cui il soggetto è stato isolato

B) CONTATTI STRETTI una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 1 metri e di durata maggiore a 10 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa medica) con un caso di COVID-19 per almeno 5 minuti, a distanza minore di 1 metri.
Sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19 nelle 72 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Nella ricostruzione dell'arco temporale in cui individuare i contatti è quindi importante considerare due variabili: 1) La data fine sintomi; 2) La data in cui il soggetto è stato isolato

C) CONTATTI STRETTI una persona che ha avuto un contatto diretto, anche non faccia a faccia, con un caso di COVID-19, a distanza minore di 3 metri e di durata maggiore a 5 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa medica) con un caso di COVID-19 per almeno 20 minuti, a distanza minore di 2 metri.
Sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19 nelle 12 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Nella ricostruzione dell'arco temporale in cui individuare i contatti è quindi importante considerare due variabili: 1) La data inizio sintomi; 2) La data in cui il soggetto è stato isolato

© SELEXI Srl

2 **D00002**

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BB 23

Inchiesta epidemiologica: come di identifica la fonte di contagio?

A) Essendo il periodo di incubazione compreso tra 0 e 14 giorni, occorre investigare le frequentazioni del caso nei 14 giorni precedenti l'inizio dei sintomi al fine di individuare la possibile fonte di contagio
Importante indagare alcuni setting:
- Domiciliare. Tra i conviventi o i frequentatori della famiglia ci sono stati casi con sintomi sospetti?
- Sanitario. Il caso ha frequentato ambulatori o luoghi di cura? (sia in qualità di operatore sanitario sia di paziente)
Altre informazioni utili, nei 14 giorni antecedenti inizio sintomi:
- che cosa ha mangiato e dove

B) Essendo il periodo di incubazione compreso tra 10 e 14 giorni, occorre investigare le frequentazioni del caso nei 14 giorni precedenti l'inizio dei sintomi al fine di individuare la possibile fonte di contagio
Importante indagare alcuni setting:
- Domiciliare. Tra i conviventi o i frequentatori della famiglia ci sono stati casi con sintomi sospetti?
- Comunitario. Il caso ha frequentato ambienti collettivi per residenza, lavoro o per svago?
Altre informazioni utili, nei 14 giorni antecedenti inizio sintomi:
- che tipo di mezzi di trasporto ha utilizzato?
- se lavoratore, ha avuto notizia di casi sospetti nella sua azienda?

* C) Essendo il periodo di incubazione compreso tra 2 e 14 giorni, occorre investigare le frequentazioni del caso nei 14 giorni precedenti l'inizio dei sintomi al fine di individuare la possibile fonte di contagio
Importante indagare tre setting:
- Domiciliare. Tra i conviventi o i frequentatori della famiglia ci sono stati casi con sintomi sospetti?
- Comunitario. Il caso ha frequentato ambienti collettivi per residenza, lavoro o per svago?
- Sanitario. Il caso ha frequentato ambulatori o luoghi di cura? (sia in qualità di operatore sanitario sia di paziente)
Aitre informazioni utili, nei 14 giorni antecedenti inizio sintomi:

3 **D00003**

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BB 23

Durante l'inchiesta epidemiologica, NELLA RACCOLTA ANAMNESTICA quali sintomi sono da rilevare per il sospetto di Covid19?

* A) Febbre; stanchezza; mal di gola; naso che cola; tosse; respiro corto; mal di testa; dolori muscolari; dolore toracico; vomito; dolori articolari; irritabilità; confusione

B) Febbre; stanchezza; dolorabilità alle ginocchia; attacchi di fame; aumento di peso; poliuria; mal di gola; tosse ; vomito; diarrea; astenia

C) Febbre; stanchezza; mal di gola; tosse; diarrea; dolori diffusi; respiro corto ; tosse; eruzioni cutanee bollose; incubi e aggressività

© SELEXI Srl

Prova non estratta

ATS BRIANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Assistente Sanitario - Cat D

PROVA PRATICA

PROVA 02

1 La sorveglianza dell'infezione e circolazione del micobatterio tubercolare.

Il test intradermico secondo Mantoux, rappresenta il test di elezione per i contatti di una persona affetta da TB contagiosa. La trasmissione interumana della TB avviene per via aerea. Per tali motivi, non appena c'è il sospetto di un caso di TB, deve essere immediatamente attivata la ricerca dei contatti.

Il candidato elenchi i "fattori chiave" che aumentano il rischio di infezione al contatto.

---

2 La sorveglianza dell'infezione e circolazione del micobatterio tubercolare.

Il test intradermico secondo Mantoux, rappresenta il test di elezione per i contatti di una persona affetta da TB contagiosa. La trasmissione interumana della TB avviene per via aerea. Per tali motivi, non appena c'è il sospetto di un caso di TB, deve essere immediatamente attivata la ricerca dei contatti.

Il candidato riporti il dosaggio, la sede di iniezione e il tempo lettura del test mantoux

---

3 La sorveglianza dell'infezione e circolazione del micobatterio tubercolare.

Il test intradermico secondo Mantoux, rappresenta il test di elezione per i contatti di una persona affetta da TB contagiosa. La trasmissione interumana della TB avviene per via aerea. Per tali motivi, non appena c'è il sospetto di un caso di TB, deve essere immediatamente attivata la ricerca dei contatti.

Lettura test Mantoux contatti stretti ADULTI CASO TB CONTAGIOSA: Il candidato riporti da quanti millimetri VIENE DEFINITO positivo e cosa viene proposto AL CONTATTO in caso di positività.

---

4 La sorveglianza dell'infezione e circolazione del micobatterio tubercolare.

Il test intradermico secondo Mantoux, rappresenta il test di elezione per i contatti di una persona affetta da TB contagiosa. La trasmissione interumana della TB avviene per via aerea. Per tali motivi, non appena c'è il sospetto di un caso di TB, deve essere immediatamente attivata la ricerca dei contatti.

Il candidato esponga la gestione del BAMBINO (> a 6 mesi e <_ 6 anni) contatto di caso con TB contagiosa convivente

© SELEXI Srl

Prova non estratta Giorgio Bartn

ATS BRIANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Assistente Sanitario - Cat D

PROVA PRATICA

PROVA 03

1 IL CORRETTO PRELIEVO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO PER LA DIAGNOSI DI COVID19

Il tampone per il prelievo viene eseguito in pochi secondi e ha un'invasività minima, originando al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto. La semplicità del prelievo non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test molecolare. Il Prelievo per ragioni di contenimento da potenziale contagio, la procedura deve essere svolta dal personale addestrato-ASSISTENTE SANITARIO utilizzando opportuni DPI.

Domanda Il candidato elenchi i 5 DPI indispensabili che l'operatore deve utilizzare per la procedura DI PRELIEVO TAMPONE

---

2 IL CORRETTO PRELIEVO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO PER LA DIAGNOSI DI COVID19

Il tampone per il prelievo viene eseguito in pochi secondi e ha un'invasività minima, originando al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto. La semplicità del prelievo non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test molecolare. Il Prelievo per ragioni di contenimento da potenziale contagio, la procedura deve essere svolta dal personale addestrato-ASSISTENTE SANITARIO utilizzando opportuni DPI.

Il candidato indichi la Procedura PRELIEVO TAMPONE vestizione corretta, mettendo in ordine temporale le fasi sottoscritte

- Raccogliere i capelli e indossare la cuffia;
- Indossare la mascherina FFP2/FFP3;
- Indossare il camice;
- Indossare il primo paio di guanti;
- Togliere monili o altro oggetto personale;
- Effettuare l'igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione alcolica;
- Indossare un secondo paio di guanti;
- Indossare gli occhiali o schermo facciale.
- Controllare l'integrità dei DPI prima di indossarli.

---

3 IL CORRETTO PRELIEVO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO PER LA DIAGNOSI DI COVID19

Il tampone per il prelievo viene eseguito in pochi secondi e ha un'invasività minima, originando al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto. La semplicità del prelievo non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test molecolare. Il Prelievo per ragioni di contenimento da potenziale contagio, la procedura deve essere svolta dal personale addestrato-ASSISTENTE SANITARIO utilizzando opportuni DPI.

il candidato descriva la procedura della svestizione elencando dalla prima all'ultima azione, come si rimuovono i seguenti DPI:
OCCHIALI; GUANTI SECONDO PAIO; CAMICE; DETERGERE LE MANI CON ACQUA E SAPONE; MASCHERINA; GUANTI PRIMO PAIO.

© SELEXI Srl